

ЛАПАРАСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗЛУКОВОЮ ХВОРОБОЮ

Овечкін В.С. Гуменюк Л.В., Овечкін Д.В., Чижик В.М., Хукаленко С.В.

Сумська обласна дитяча клінічна лікарня

Наслідком будь-якого оперативного втручання на органах черевної порожнини є утворення злук, що призводить як до розвитку гострої злукової непрохідності, так і до злукової хвороби, що характеризується виникненням періодичного больового симптому у дітей без порушення кишкової прохідності. У такому випадку, коли дитина повторно поступає до хірургічного відділення з болями в животі, рекомендується проведення лапараскопії з діагностично-лікувальною метою.

У хірургічному відділенні СОДКЛ прооперовано 15 дітей з приводу злукової хвороби, з них 9 дівчаток та 6 хлопчиків. Проведено лапараскопічний адгезіолізис, що полягав у роз'єднанні вісцero-вісцеральних та вісцero-паріетальних злук. Післяопераційний період у всіх випадках протікав без ускладнень, діти виписані зі стаціонару на 5-6 добу.

Висновок: перевагами методу є те, що лапараскопія є більш інформативною та менш травматичною за лапаратомію. Після лапараскопічного лікування менша кількість післяопераційних ускладнень та частота рецидивів, зменшується кількість ліжкоднів та гарний косметичний ефект.